

中国白花丹科植物志资料

彭泽祥

(兰州大学)

MATERIAE AD FLORAM PLUMBAGINACEARUM SINENSII

Peng Tse-xiang

(Lanzhou University)

拉萨小蓝雪, 新变型

Ceratostigma minus Stapf ex Prain forma *lasaense* Peng, forma nova

A type recedit ramulis annotinis hirtellis, pilis vix 0.5—1 mm longis, foliis chartaceis, saepe angusto-oblongeolatis usque oblongo-oblongeolatis, supra secus nervos laterales plus minusve prominentibus et non vel parvis calcareo-lepidotis, antheris majoribus, c. 1.8—2 mm longis, capsulis minimis, c. 2 mm longis.

Typus: K. F. Fu 548 (PE)*

Xizang: Zhanang, Qinggushan, alt. 3600 m, K. F. Fu 548.

本变型与原变型不同之处在于: 新枝上长硬毛短小(长不超过1毫米); 叶坚纸质, 通常窄倒披针形至长圆状倒披针形, 上面常沿侧脉或降纹无或有稀少的钙粒; 花药较大, 长1.8—2毫米; 蒴果较小, 长约3毫米。

西藏: 札囊, 桑依, 青姑山, 傅国勋548(模式标本PE)。

光萼彩花, 新变种

Acantholimon alatavicum Bunge var. *laevigatum* Peng, var. nov.

A var. *alatavico* recedit foliis subplanis, pallide viridibus 1—2.5 mm longis, bracteis minoribus, exterioribus c. 3—3.5 mm longis, interioribus primis c. 6—6.5 mm longis, calyce brevioris, 8—9 mm longo, plerumque glabro.

Typus: K. C. Kuan 4564. (PE)

Xinjiang: Wenquan, K. C. Kuan 4564

与原变种不同之处在于: 本变种叶近扁平, 淡绿色, 长1—2.5厘米; 苞较小(外苞长约3—3.5毫米, 第1内苞长约6—6.5毫米), 萼长约8—9毫米, 光滑无毛。

新疆: 温泉, 关帝庙4654(模式标本PE)

* 中国科学院植物研究所标本室

美花补血草，新亚种

***Limonium drepanostachyum* Ik.-Gal. ssp. *callianthum* Peng, ssp. nov.**

A ssp. *drepanostachyo* recedit bracteis interioribus primis glabris vel leviter hirsutis (nec dense pubescentibus), calyce longiore ad 6.5—7 mm (nec 4.5—6.5 mm) longo et habitu divergenti.

Typus: A. J. Li et J. N. Zhu 7996 (PE)

Xingjiang: Artux, A. J. Li et J. N. Zhu 7996 (PE)

本亚种与原亚种的区别在于：第1内苞无毛或略有毛（而非密被长毛），萼较长（非4.5—6.5毫米）。

新疆：阿图什，李安仁和朱家楠7996（模式标本PE）。