

文章编号: 1000-3142(2000)02-0144-05

广西植物新资料

Q448.526.7

阎丽春¹, 覃海宁²

: 1. 中国科学院西双版纳热带植物园, 云南昆明 650223; 2. 中国科学院植物研究所标本馆, 北京 100093.

摘要: 报道了广西植物分布新记录属 1 个、新记录种 19 个。

关键词: 广西; 新记录; 植物 木兰科, 荨麻科, 山茶科

中图分类号: Q948.5 (267) 文献标识码: A

Some new recorded plants from Guangxi, China

YAN Li-chun¹, QIN Hai-ning²

(1. Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, the Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223, China,

2. Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China)

Abstract: 1 genus, 19 species collected from Guangxi are reported as new records to this region

Key words: Guangxi; new record; plant

1998年春季和秋季,笔者先后参加了中国科学院植物研究所主持的中科院科考项目对广西的植物资源调查活动,并负责其中那坡县植物区系的研究。笔者在有关的标本鉴定中发现了一些广西过去未曾记录过的植物,现加以整理后形成此文。本文引用的标本绝大部分是该次考察活动所采,部分标本是1989年华南植物研究所红水河考察队所采,还有一号标本是中英考察队所采。以上标本均收藏于中科院植物研究所标本馆(PE)。

木兰科 Magnoliaceae

馨香玉兰

Magnolia odoratissima Law et R. Z. Zhou in Bull. Bot. Res. (Harbin) 6 (2): 139, pl. 1. 1986; Fl. Reip. Popul. Sin. 30 (1): 115, fig. 27. 1996.

广西: 那坡县, 百都乡, 弄化村; 石灰岩石山, 海拔 1 300 m。常绿乔木, 树高 10 m, 果木质, 生枝顶。1998年 11月 8日, 中科院考察队(覃海宁、张明理等) 2483 (PE)。

分布: 云南(广南, 西畴)。广西首次记录。

收稿日期: 1999-06-07

作者简介: 阎丽春(1973-), 女, 硕士, 植物分类学专业, 从事种子植物区系地理学的研究工作。

基金项目: 中国科学院生物分类区系特别支持费重大项目: 资环“九七(1~3)”。

模式标本采自云南西畴。

腊梅科 Calycanthaceae

西南腊梅

Chimonanthus campanulatus R. H. Chang et C. S. Ding in Acta Phytotax. Sin. **18** (3): 330, fig. 2. 1980; Sylva Sin. **2**: 1175, fig. 526: 1~11. 1985.

广西: 那坡县, 龙合乡, 善合村, 规连屯; 石灰岩石山, 山坡, 海拔 950 m. 灌木, 树高 4 m, 花被淡黄色。1998 年 11 月 10 日, 中科院考察队 (覃海宁、张明理等) 2517 (PE)。

分布: 云南 (麻栗坡, 禄劝, 会泽)。广西首次记录。

模式标本采自云南禄劝。

荨麻科 Urticaceae

竹叶冷水花

Pilea ambusifolia C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) **2** (3): 95, pl. 7 (3~6). 1982; Fl. Reip. Popul. Sin. **23** (2): 127, fig. 28: 1~3. 1995.

广西: 那坡县, 平孟镇, 念井村; 石灰岩石山, 山坡, 灌丛, 海拔 900 m. 1997 年 4 月 29 日, 中英考察队 ASBK283 (PE)。

分布: 贵州西南部, 生于崖壁上。广西首次记录。

模式标本采自贵州关岭。

山茶科 Theaceae

大杨桐

Adinandra grandis L. K. Ling (Icon. Corm. Sin. Suppl. **2**: 477. 1983, in Clavi. non-nud.); Fl. Reip. Popul. Sin. **50** (1): 34, fig. 11: 1~7, Addenda 190. 1998.

广西: 那坡县, 百都乡, 弄布村; 山地, 山谷, 海拔 1200 m. 小乔木, 树高 4 m, 花苞米黄色。1989 年 4 月 29 日, 华南植物研究所红水河考察队 952 (PE)。

分布: 云南 (元阳县和金平县), 老挝也有。广西首次记录。

模式标本采自云南元阳县。

葡萄科 Vitaceae

毛三裂蛇葡萄

Ampelopsis delavayana Planch. var. *setulosa* (Diels et Gilg) C. L. Li in Chun. J. Appl. Environ. Biol. **2** (1): 48. 1996; Fl. Reip. Popul. Sin. **48** (2): 44. 1998. — *A. acuminifolia* Bunge var. *setulosa* Diels et Gilg in Bot. Jahrb. **29**: 465. 1900.

广西: 那坡县, 城厢镇, 中强村, 弄内屯; 山地, 山坡, 海拔 900 m. 攀援木质藤本, 果熟时蓝色。1998 年 10 月 30 日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1802 (PE)。

分布: 陕西, 甘肃, 河南, 河北, 四川, 贵州, 云南。广西首次记录。

模式标本采自贵州贵阳。

柔毛草崖藤

Tetrastigma apiculatum Gagnep. var. **pubscens** C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 1 (1): 314. 1995; Fl. Reip. Popul. Sin. 48 (2): 96. 1998.

广西: 那坡县, 平孟镇, 旧村, 那定屯; 山地, 山坡, 密林, 海拔 150 m. 1998 年 1 月 13 日. 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 539 (PE).

分布: 云南, 海南. 广西首次记录.

模式标本采自云南金平.

茄科 Solanaceae**酸浆**

Physalis alkekengi L. Sp. Pl. 183. 1753; Fl. China 17: 311. 1994.

广西: 那坡县, 城厢镇; 山地, 山坡, 海拔 850 m. 1998 年 10 月 24 日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1381 (PE).

分布: 甘肃, 贵州, 河北, 河南, 湖北, 山西, 四川, 云南; 俄罗斯, 巴基斯坦, 东南亚. 欧洲等地也有分布. 广西首次记录.

模式标本采自意大利.

禾本科 Poaceae**甜茅**

Glyceria acutiflora Torr. subsp. **japonica** (Steud.) T. Koyama et Kawano in Can. Journ. Bot. 42 (7): 868~860. 1. 5. fig. 40 et 7. 1964. — *Hemibromus japonicus* Steud. Syn. Pl. Glum. Pt. 1, 317. 1854.

广西: 那坡县, 德孚保护区; 山地, 田野, 海拔 1100 m. 1989 年 4 月 27 日, 华南植物研究所红水河考察队 217.

分布: 河南, 浙江, 江苏, 福建, 江西, 湖南, 四川; 朝鲜和日本也有. 属和种在广西是首次记录.

模式标本采自日本.

海南柳叶箬

Isachne hainanensis Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10 (1): 23, pl. 2. 1965; Fl. Reip. Popul. Sin. 10 (1): 191, pl. 6~11. 1990.

广西: 那坡县, 城厢镇, 中强村; 山谷, 草地, 海拔 980 m. 直立草本, 小穗紫色. 1995 年 10 月 30 日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1778 (PE).

分布: 广东, 海南. 广西首次记录.

模式标本采自海南崖县.

莎草科 Cyperaceae**华南苔草**

Carex austrosinensis Tang et Wang ex S. Y. Liang in Acta Phytotax. Sin. 10 (1): 23, pl.

2. 1965.

广西: 那坡县, 城厢镇, 永靖村; 石灰岩石山, 灌丛, 海拔 1 100 m。1998 年 4 月 12 日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 472 (PE); 坡荷乡, 善合屯, 山坡, 密林, 海拔 1 000 m。1998 年 4 月 17 日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 815 (PE)。

分布: 广东。广西首次记录。

模式标本采自广东云浮。

肿喙苔草

Carex oedorrhapha Nelmes in Kew Bull. 659. 1939; Raymond in Natur. Canad. 82: 161. 1995 et in Mem. Jard. Bot. Montr. 53: 83. 1959, excl. var.

广西: 那坡县, 德孚自然保护区; 山地, 山谷, 水旁, 海拔 1 100 m。1998 年 1 月 9 日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 201 (PE)。

分布: 广东, 云南。也分布于喜马拉雅东部, 以及越南, 泰国, 印度尼西亚。广西首次记录。

模式标本采自锡金。

四川莎草

Cyperus szechuanensis T. Koyama in Jap. Journ. Bot. 15: 182. 1956.

广西: 那坡县, 德隆乡; 草地, 海拔 700 m。直立草本, 小穗绿色。1998 年 10 月 29 日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1714 (PE)。

分布: 四川。广西首次记录。

模式标本采自四川。

矮红鳞扁莎

Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees form. *humilis* (Miq.) L. K. Dai in Fl. Reip. Popul. Sin. 11: 171. 1961. — *Cyperus eragrostis* Vahl var. *humilis* Miq. Fl. Ind. Br. 3: 257. 1859.

广西: 那坡县, 城厢镇; 田间, 湿地, 海拔 850 m。直立草本, 小穗褐色。1998 年 10 月 25 日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1534、1513 (PE)。

分布: 山西, 河南; 中亚至印度尼西亚。广西首次记录。

模式标本采自印度尼西亚。

百球蘆草

Scirpus rosthonii Diels in Bot. Jahrb. 29: 228. 1901; Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 253. 1903.

广西: 那坡县, 下华乡, 规弄山; 山地, 山谷, 水旁, 海拔 1 200 m。1998 年 4 月 15 日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 655 (PE)。

分布: 浙江, 湖北, 福建, 广东, 四川, 重庆, 云南。广西首次记录。

模式标本采自重庆南川金佛山。

百合科 Liliaceae

富宁菝葜

Smilax fooningensis Wang et Tang in Fl. Reip. Popul. Sin. 15: 229. 1978.

广西：那坡县，城厢镇，永靖村；石灰岩石山，海拔 1 100 m。1998 年 4 月 12 日。中科院考察队（覃海宁、王印政等）508（PE）。

分布：云南。广西首次记录。

模式标本采自云南富宁。

长叶菝葜

Smilax lanceifolia Roxb. var. *lanceolata* (Norton) T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **13**: 26. 1960. — *S. cocculoides* Warb. var. *lanceolata* Norton in Sargent, Pl. Wils. **3**: 11. 1916.

广西：那坡县，德孚自然保护区；山地，山谷，海拔 1 300 m。灌木，果绿色。1989 年 5 月 6 日，华南植物研究所红水河考察队 332（PE）。

分布：云南南部（临沧，思茅，金平，屏边，文山）。广西首次记录。

模式标本采自云南思茅。

兰科 Orchidaceae

白花贝母兰

Coelogyne leucantha W. W. Smith. in Notes Bot. Gard. Edinb. **13**: 198. 1921.

广西：那坡县，百都乡，弄布村；山地，山顶，海拔 1 100 m。草本，花白色。1989 年 7 月 22 日，华南所红水河考察队 964（PE）。德孚保护区旧场；山地，山谷，海拔 1 300 m；草本。1989 年 4 月 26 日，华南植物研究所红水河考察队 121（PE）。

分布：四川西南部，云南西部至东南部。广西首次记录。

模式标本产于缅甸与云南西部交界处。

舌唇槽舌兰

Holcoglossum lingulatum (Aver.) Aver. in Consp. Sosud. Rast. Fl. Vietnam **1**: 110. 1990, et Iden, Guide Vietnam Orch. : 345. 1994. — *H. kimballianum* var. *lingulatum* Aver. in Bot. Zhurn. **73** (3): 426. 1998.

广西：那坡县，百都乡，弄化村；石灰岩石山，海拔 1 300 m。披散草本，花瓣粉红色。1998 年 11 月 8 日，中科院考察队（覃海宁、张明理等）2496（PE）。

分布：云南（麻栗坡），越南。广西首次记录。

模式标本采自越南。

尖叶石仙桃

Pholidota missionarionem Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, **3**: 145. 1931

广西：那坡县，城厢镇，永靖村；山地，灌丛，海拔 1 100 m。直立草本。1998 年 4 月 12 日，中科院考察队（覃海宁、王印政等）473（PE）。

分布：云南，贵州（西南部）。广西首次记录。

模式标本采自贵州平坝。

标本鉴定曾获以下专家惠助：李振宇、梁松筠、戴伦凯、刘亮、陈家瑞、郎楷永、吉占和、张志耘、林祁、陈心启、李振宇教授对原稿提出宝贵修改意见。谨此一并致谢。