

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw201912004

李腾, 唐启明, 韦玉梅, 等. 广西青藓科分类学修订 [J]. 广西植物, 2021, 41(8): 1372–1390.

LI T, TANG QM, WEI YM, et al. A revision of Brachytheciaceae (Bryophyta) of Guangxi, China [J]. Guihaia, 2021, 41(8): 1372–1390.



广西青藓科分类学修订

李 腾¹, 唐启明², 韦玉梅², 赵建成¹, 李 敏^{1*}

(1. 河北师范大学 生命科学院, 石家庄 050024; 2. 广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室,

广西壮族自治区 广西植物研究所, 广西 桂林 541006)

摘 要: 通过对采自广西 24 个县(市)的 1 147 份青藓科植物标本的逐一鉴定及相关文献的查阅, 确认有广西青藓科植物 11 属、44 种, 其中包括广西青藓科植物新记录属 1 属, 即拟异叶藓属 (*Pseudokindbergia*), 新记录种 7 种, 分别为匍枝青藓 (*Brachythecium procumbens*)、阔叶尖喙藓 (*Oxyrrhynchium latifolium*)、泛生尖喙藓 (*O. vagans*)、拟异叶藓 (*Pseudokindbergia dumosa*)、华东细喙藓 (*Rhynchostegiella sinensis*)、长肋拟青藓 (*Sciurohypnum populeum*) 和弯叶拟青藓 (*S. reflexum*)。该文提供了修订后的广西青藓科植物名录, 并对其中的新记录属、种的主要形态学识别特征、生境和地理分布等进行了详细描述。

关键词: 青藓科, 拟异叶藓属, 尖喙藓属, 长喙藓属, 拟青藓属

中图分类号: Q949.35 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3142(2021)08-1372-19

A revision of Brachytheciaceae (Bryophyta) of Guangxi, China

LI Teng¹, TANG Qiming², WEI Yumei², ZHAO Jiancheng¹, LI Min^{1*}

(1. College of Life Sciences, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China; 2. Guangxi Key Laboratory of Plant Conservation and Restoration Ecology in Karst Terrain, Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences, Guilin 541006, Guangxi, China)

Abstract: A total of 1 147 specimens of Brachytheciaceae from 24 counties (cities) in Guangxi were studied. After identifying and reviewing related literatures, 11 genera and 44 species were confirmed. Among them, the genus *Pseudokindbergia* and seven species, *Brachythecium procumbens*, *Oxyrrhynchium latifolium*, *O. vagans*, *Pseudokindbergia dumosa*, *Rhynchostegiella sinensis*, *Sciurohypnum populeum* and *S. reflexum*, were newly recorded in Guangxi. In this paper, a revised checklist of Brachytheciaceae of Guangxi was provided. And the morphological characters, habitats, geographical distribution of the new records were also described in great detail.

Key words: Brachytheciaceae, *Pseudokindbergia*, *Oxyrrhynchium*, *Rhynchostegium*, *Sciurohypnum*

收稿日期: 2020-01-14

基金项目: 国家自然科学基金 (31960045); 河北省自然科学基金 (C2019205115); 河北省高等学校科学技术研究项目 (ZD2018049); 河北师范大学科技类基金 (L2019Z06) [Supported by the National Natural Science Foundation of China (31960045); Natural Science Foundation of Hebei Province (C2019205115); Hebei Provincial Project of Scientific and Technological Research in Colleges and Universities (ZD2018049); Scientific and Technological Fund of Hebei Normal University (L2019Z06)]。

作者简介: 李腾 (1992-), 硕士, 主要从事藓类植物系统分类学研究, (E-mail) 2405785742@qq.com。

* **通信作者:** 李敏, 博士, 副教授, 主要从事藓类植物系统分类学研究, (E-mail) limin@hebtu.edu.cn。

广西壮族自治区位于中国南部($104^{\circ}26' - 112^{\circ}04' \text{ E}$ 、 $20^{\circ}54' - 26^{\circ}24' \text{ N}$),南临北部湾,海岸线曲折。广西山地众多,其总面积占全区总面积的 $3/4$ 以上,而境内典型的喀斯特地貌占广西总面积的 $1/3$ 以上。复杂而独特的地形与地貌特点孕育了广西丰富而独特的生物资源(苏宗明等, 2014)。

综合前人的研究成果,Wei et al. (2018) 根据正式发表的相关文献整理发表了广西苔藓植物名录,其中包括青藓科植物 11 属、65 种。同年,魏倩倩等(2018)报道了广西藓类植物新记录 25 科、36 属、47 种,其中包括青藓科植物新记录 2 属、3 种。因此,广西青藓科植物目前已报道 11 属、68 种,占中国青藓科植物总种数(120 种)的 $1/2$ 以上(Li et al., 2015b)。

鉴于广西丰富的青藓科资源但又缺乏系统的分类学研究,作者在 2017 年至 2018 年间收集了采自广西 24 个县(市)的青藓科植物标本 1 147 份(包括前人已发表的有关广西青藓科的文献中的凭证标本),并基于此对广西青藓科植物进行了系统地分类学修订。通过对上述标本的逐一形态学鉴定,并结合广西最新苔藓植物名录以及最新报道的文献记载(Wei et al., 2018; 魏倩倩等, 2018),确认广西青藓科植物有 11 属、44 种,其中包括广西青藓科植物新记录属 1 属、新记录种 7 种。本文对这些新分布类群的主要形态识别特征、地理分布等特征进行了详细地阐述。凭证标本现存放于河北师范大学植物标本馆(HBNU)、广西植物研究所标本馆(IBK)、华东师范大学标本馆(HSNU)、中科院植物研究所标本馆(PE)、上海师范大学植物标本馆(SHNU)和贵州大学植物标本馆(GACP)。

1 广西青藓科植物修订名录

经过对采自广西的 1 147 份青藓科植物标本的系统分类学研究,修订后的广西青藓科植物有 11 属、44 种(表 1)。

2 广西青藓科植物新记录

2.1 新记录属

2.1.1 拟异叶藓属

Pseudokindbergia Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & B. C. Tan., Cryptog. Bryol. 36(1): 61. 2015.

单种属;属特征详见种的主要识别特征(Li et al., 2015a)。

2.1.1.1 拟异叶藓 图版 I

Pseudokindbergia dumosa (Mitt.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & B. C. Tan, Cryptog. Bryol. 36(1): 61. 2015.

主要识别特征:植物体大型;茎叶与枝叶明显异形。假鳞毛半圆形或三角状半圆形。茎叶先端渐尖或急尖,形成长毛尖状;中肋粗壮,达叶片中部以上;中部细胞菱形至线形;基部呈阔心形至三角形,具下延,角区细胞长方形。枝叶较小,卵状披针形至三角状披针形,叶先端渐尖,叶缘具粗齿;中肋末端有刺突;中部细胞长菱形至线形。

标本鉴定 融水县:汪楣芝 46939 (被错误鉴定为 *Brachythecium brotheri*) (PE);龙胜县:郭水良、于晶 110619523 (SHNU);兴安县:刘倩、左勤 965,刘倩、朱永清、王幼芳 1684,609 (HSNU)。

分布:中国(甘肃、陕西、西藏、四川、重庆、湖南、云南、广西、台湾),尼泊尔,不丹,印度(Li et al., 2015a)。

2.2 新记录种

2.2.1 匍枝青藓 图版 II: 1-4

Brachythecium procumbens (Mitt.) A. Jaeger, Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876-77: 341 (Gen. Sp. Musc. 2: 409). 1878.


主要识别特征:假鳞毛三角状。茎叶卵形至三角状卵形,叶先端长渐尖,中肋达叶片的 $1/2 \sim 2/3$ 处;中部细胞长菱形,末端尖锐;叶基部浅心形,角区细胞有分化,方形或矩圆形。枝叶与茎叶同形,略小,其余特征同茎叶。

标本鉴定 乐业县:唐启明、张仕艳 20181001-213 (HBNU, IBK)。

表 1 广西青藓科植物修订名录


Table 1 Revised checklist of Brachytheciaceae in Guangxi, China

属名 Genus name	种名 Species name
气藓属 <i>Aerobryum</i>	气藓 <i>A. speciosum</i> Dozy et Molk.
青藓属 <i>Brachythecium</i>	多褶青藓 <i>B. buchananii</i> (Hook.) A. Jaeger
	台湾青藓 <i>B. formosanum</i> Takaki
	圆枝青藓 <i>B. garovaglioides</i> Müll. Hal.
	灰青藓 <i>B. glauculum</i> Müll. Hal.
	粗枝青藓 <i>B. helminthocladum</i> Broth. & Paris
	同枝青藓 <i>B. homocladum</i> Müll. Hal.
	柔叶青藓 <i>B. moriense</i> Besch.
	燕尾青藓 <i>B. novae-angliae</i> (Sull. & Lesq.) A. Jaeger
	悬垂青藓 <i>B. pendulum</i> Takaki
	华北青藓 <i>B. pinnirameum</i> Müll. Hal.
	毛尖青藓 <i>B. piligerum</i> Cardot
	匍枝青藓 <i>B. procumbens</i> (Mitt.) A. Jaeger
	溪边青藓 <i>B. rivulare</i> Schimp.
	长叶青藓 <i>B. rotaeanum</i> De Not.
	卵叶青藓 <i>B. rutabulum</i> (Hewd.) Schimp.
美喙藓属 <i>Eurhynchium</i>	扭尖美喙藓 <i>E. kirishimense</i> Takaki
同蒴藓属 <i>Homalothecium</i>	无疣同蒴藓 <i>H. laevisetum</i> Sande Lac.
鼠尾藓属 <i>Myuroclada</i>	羽枝鼠尾藓 <i>M. longiramea</i> (Müll. Hal.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & Huttunen
	鼠尾藓 <i>M. maximowiczii</i> (G. G. Borshch.) Steere & W. B. Schofield
尖喙藓属 <i>Oxyrrhynchium</i>	卵叶尖喙藓 <i>O. hians</i> (Hedw.) Loeske
	阔叶尖喙藓 <i>O. latifolium</i> (Cardot) Podp.
	疏网尖喙藓 <i>O. laxirete</i> (Broth.) Broth.
	密叶尖喙藓 <i>O. savatieri</i> (Schimp. ex Besch.) Broth.
	泛生尖喙藓 <i>O. vagans</i> (A. Jaeger) Ignatov & Huttunen
	褶叶藓 <i>P. leskeoides</i> (Hook.) E. Britton
拟异叶藓属 <i>Pseudokindbergia</i>	拟异叶藓 <i>P. dumosa</i> (Mitt.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & B. C. Tan
细喙藓属 <i>Rhynchostegiella</i>	日本细喙藓 <i>R. japonica</i> Dix. et Thér.
	光柄细喙藓 <i>R. laeviseta</i> Broth.
	细肋细喙藓 <i>R. leptoneura</i> Dix. & Thér.
	锐尖细喙藓 <i>R. menadensis</i> (Sande Lac.) E. B. Bartram
	华东细喙藓 <i>R. sinensis</i> Broth. & Paris
	西里伯长喙藓 <i>R. celebicum</i> (Sande Lac.) A. Jaeger
	缩叶长喙藓 <i>R. contractum</i> Cardot
	杜氏长喙藓 <i>R. duthiei</i> Müll. Hal. et Dix.
	斜枝长喙藓 <i>R. inclinatum</i> (Mitt.) A. Jaeger
	卵叶长喙藓 <i>R. ovalifolium</i> S. Okamura
长喙藓属 <i>Rhynchostegium</i>	淡枝长喙藓 <i>R. pallenticaule</i> Müll. Hal.
	淡叶长喙藓 <i>R. pallidifolium</i> (Mitt.) A. Jaeger
	水生长喙藓 <i>R. riparioides</i> (Hedw.) Cardot
	匍枝长喙藓 <i>R. serpenticale</i> (Müll. Hal.) Broth.
	羽枝拟青藓 <i>S. plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
	长肋拟青藓 <i>S. populeum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
	弯叶拟青藓 <i>S. reflexum</i> (Starke) Ignatov & Huttunen
拟青藓属 <i>Sciuro-hypnum</i>	




1-2. 茎叶; 3-4. 枝叶; 5. 茎叶叶尖; 6. 枝叶叶尖; 7. 茎叶基部; 8. 枝叶基部; 9. 茎叶基部角区; 10. 枝叶基部角区; 11. 茎叶中部细胞; 12. 枝叶中部细胞; 13. 假鳞毛; 14. 植物体。(凭证标本: 郭水良, 于晶 110619523)
1-2. Stem leaf; 3-4. Branch leaf; 5. Tip of stem leaf; 6. Tip of branch leaf; 7. Base of stem leaf; 8. Base of branch leaf; 9. Alar cells of stem leaf; 10. Alar cells of branch leaf; 11. Median laminal cells of stem leaf; 12. Median laminal cells of branch leaf; 13. Pseudoparaphyllia; 14. Plant. (Voucher specimen; Shuiliang Guo & Jing Yu 110619523)

图版 I 拟异叶藓
Plate I *Pseudokindbergia dumosa*



1-4. 匍枝青藓 1. 茎叶; 2. 枝叶中部细胞; 3. 茎叶角区; 4. 假鳞毛。 5-9. 阔叶尖喙藓 5. 茎叶; 6. 枝叶; 7. 茎叶中部细胞; 8. 茎叶角区; 9. 假鳞毛。 10-13. 泛生尖喙藓 10. 茎叶; 11. 茎叶中部细胞; 12. 枝叶先端; 13. 假鳞毛。(凭证标本: 1-4 唐启明、张仕艳 20181001-213; 5-9 唐启明 20180609-203; 10-13 韦玉梅等 20141208-18)
1-4. *Brachythecium procumbens* 1. Stem leaf; 2. Median laminal cells of branch leaf; 3. Alar cells of stem leaf; 4. Pseudoparaphyllia.
5-9. *Oxyrrhynchium latifolium* 5. Stem leaf; 6. Branch leaf; 7. Median laminal cells of stem leaf; 8. Alar cells of stem leaf; 9. Pseudoparaphyllia. 10-13. *Oxyrrhynchium vagans* 10. Stem leaf; 11. Median laminal cells of stem leaf; 12. Tip cells of branch leaf; 13. Pseudoparaphyllia. (Voucher specimens; 1-4. *Qiming Tang & Shiyan Zhang* 20181001-213; 5-9. *Qiming Tang* 20180609-203; 10-13. *Yumei Wei et al.* 20141208-18)

图版 II 匍枝青藓、阔叶尖喙藓和泛生尖喙藓
Plate II *Brachythecium procumbens*, *Oxyrrhynchium latifolium* and *O. vagans*



1-4. 华东细喙藓 1. 茎叶；2. 枝叶；3. 茎叶中部细胞；4. 茎叶角区。 5-9. 长肋拟青藓 5. 茎叶；6. 枝叶；7. 枝叶中部细胞；8. 枝叶角区；9. 假鳞毛。 10-14. 弯叶拟青藓 10. 茎叶；11. 茎叶中部细胞；12. 茎叶基部；13. 茎叶角区；14. 假鳞毛。（凭证标本：1-4. 王健等 20130817-126；5-9. 赖明洲 KS89-218；10-14. 唐启明 20180907-20）

1-4. *Rhynchostegiella sinensis* 1. Stem leaf; 2. Branch leaf; 3. Median laminal cells of stem leaf; 4. Alar cells of stem leaf. 5-9. *Sciuro-hypnum populeum* 5. Stem leaf; 6. Branch leaf; 7. Median laminal cells of branch leaf; 8. Alar cells of branch leaf; 9. Pseudoparaphyllia. 10-14. *Sciuro-hypnum reflexum* 10. Stem leaf; 11. Median laminal cells of stem leaf; 12. Base of stem leaf; 13. Alar cells of stem leaf; 14. Pseudoparaphyllia. (Voucher specimens: 1-4. *Jian Wang* et al. 20130817-126; 5-9. *Mingzhou Lai* KS89-218; 10-14. *Qiming Tang* 20180907-20)

图版 III 华东细喙藓、长肋拟青藓和弯叶拟青藓

Plate III *Rhynchostegiella sinensis*, *Sciuro-hypnum populeum* and *S. reflexum*

分布:中国(新疆、陕西、山西、河北、江苏、浙江、西藏、四川、贵州、江西、云南、广西、台湾),韩国,日本,印度,尼泊尔,斯里兰卡(贾渝和何思, 2013)。

2.2.2 阔叶尖喙藓 图版 II :5-9

Oxyrrhynchium latifolium (Cardot) Podp., Spisy Přír. Fak. Univ. v Brně 116: 33. 1929.

主要识别特征:植物体粗壮,茎匍匐,不规则分枝。假鳞毛半圆形、钝。茎叶宽卵形,叶先端具有小尖头,中肋粗壮,达叶片 4/5 处,末端有刺突;叶中部细胞菱形或长菱形,基部细胞比较宽且短,常具壁孔;角区分化不明显。枝叶与茎叶同形,略小。

标本鉴定 乐业县:唐启明 20171020-064, 20171021-010, 20180409-34, 20180409-75, 20180413-436, 20180416-735, 20180609-199, 20180609-202, 20180609-203(HBNU, IBK);唐启明、张仕艳 20181001-210, 20181008-608(HBNU, IBK);靖西县:韦玉梅 8-389A(HBNU, IBK);龙州县:韦玉梅 5654A(HBNU, IBK);上思县:王幼芳等 2014183(HSNU);融水县:龙光日 91075A(PE);兴安县:王幼芳、左勤 1317(被错误鉴定为 *Eurhynchium longirameum*)(HSNU)。

分布:中国(贵州、浙江、广东、广西),朝鲜,日本(刘倩, 2010;贾渝和何思, 2013)。

讨论:阔叶尖喙藓(*Oxyrrhynchium latifolium*)和卵叶尖喙藓(*O. hians*)是尖喙藓属中叶均较宽而形态较为相近种。两者的不同之处是前者叶形为阔卵形,最宽处靠近叶基部;而后者叶型为宽椭圆形,最宽处在叶中部。

2.2.3 泛生尖喙藓 图版 II :10-13

Oxyrrhynchium vagans (A. Jaeger) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11:273. 2002.

主要识别特征:茎匍匐。假鳞毛半圆形。茎叶卵圆形,先端渐尖,基部圆形,叶边缘具细锯齿,中肋达叶片的 0.7;叶中部细胞线形,基部细胞矩圆形。枝叶椭圆形,中肋达叶片 0.6~0.75,中肋顶端具刺突。

标本鉴定 靖西县:韦玉梅等 20141208-18(HBNU, IBK);兴安县:王幼芳、左勤 356(HSNU)。

分布:中国(安徽、浙江、四川、贵州、湖南、云南、台湾),印度,尼泊尔,巴基斯坦,缅甸,越南,泰国,斯里兰卡,老挝,马来西亚,印度尼西亚,菲律宾,美国(夏威夷)(Ignatov et al., 2005)。

讨论:该种与卵叶尖喙藓(*O. hians*)和密叶尖喙藓(*O. savatieri*)较为接近,与两者的不同之处是泛生尖喙藓(*O. vagans*)靠近叶尖处的细胞为长薄壁细胞。在中国最新的苔藓植物物种名录中并未收录该种(贾渝和何思, 2013),但 Ignatov et al. (2005)认为该种在中国的湖南、安徽、贵州、四川、台湾、云南和浙江有分布。该物种在广西的发现不仅证实了其确实在中国有分布,并且扩大了其在国内的分布范围。

2.2.4 华东细喙藓 图版 III :1-4

Rhynchostegiella sinensis Broth. & Paris, Rev. Bryol. 35: 128. 1908.

主要识别特征:植物体细弱。茎叶卵状披针形或卵形,叶先端渐尖,中肋达叶片 2/3 处,或更长。叶中部细胞菱形或短菱形,角区细胞方形或长方形。枝叶卵形,中肋末端具刺突;叶中部细胞短菱形,角细胞分化明显,方形。孢蒴倾斜,椭圆状圆柱形,蒴柄红棕色,光滑。

标本鉴定 那坡县:王健等 20130817-124, 20130817-126(HSNU)。

分布:中国特有(上海、江苏、浙江、广西)(贾渝和何思, 2013)。

2.2.5 长肋拟青藓 图版 III :5-9

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11: 270. 2002 [2003].

主要识别特征:植物体中等尺寸,不规则分枝。假鳞毛三角状,边缘具微齿。茎叶宽卵状披针形至卵状披针形,先端渐尖,中肋强劲及顶;叶中部细胞蠕虫状,角细胞方形至矩形,壁略厚。枝叶卵状披针形,其他特征与茎叶一致。

标本鉴定 那坡县:王健等 20130818-36A(HSNU),贾鹏等 NP091024144(GACP);天峨县:赖明洲 KS89-218(PE)。

分布:中国(新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、陕西、河北、北京、山东、河南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江、云

南、贵州、重庆、广西、台湾), 韩国, 日本, 不丹, 印度, 巴基斯坦, 尼泊尔, 印度尼西亚(爪哇), 俄罗斯, 欧洲, 北美(贾渝和何思, 2013)。

2.2.6 弯叶拟青藓 图版 III: 10-14

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen, *Arctoa* 11: 270. 2002 [2003].

主要识别特征: 假鳞毛半圆形平截或钝。茎叶阔卵形至三角状卵形, 叶先端长渐尖, 中肋近叶尖; 叶中部细胞菱形至线状菱形, 叶基具下延, 角区细胞分化未达中肋, 呈长矩形。枝叶卵状披针形, 基部略下延, 其余特征同茎叶。

标本鉴定 兴安县: 唐启明 20180907-20 (HBNU, IBK)。

分布: 中国(新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、陕西、山西、河北、山东、河南、安徽、江苏、上海、浙江、四川、重庆、贵州、湖南、江西、福建、云南、广西、广东), 日本, 印度, 俄罗斯, 巴基斯坦, 塔吉克斯坦, 欧洲, 北美(贾渝和何思, 2013)。

讨论: 弯叶拟青藓与长肋拟青藓较为相似。两者的不同之处是前者茎叶阔卵形至三角状卵形, 后者茎叶阔卵状披针形至卵状披针形; 前者角区细胞较大, 多为长矩形, 后者角区细胞方形至矩形。

3 合并种、存疑种和排除种

经过对采自广西的 1 147 份青藓科植物标本的逐一形态学鉴定, 修订后的广西青藓科植物有 11 属、44 种。由于这一研究结果与前人已报道名录中的 68 种差距较为悬殊, 作者再次认真研究了前人的文献及凭证标本, 并对名录中有差别的物种进行了逐一分析, 最终将其归结为以下三种情况。

3.1 合并种

近二十年来, 随着分子生物学研究方法在青藓科植物研究中的不断应用, 青藓科分类系统以及部分物种的概念发生了变化, 这就导致一些物种之间进行了合并。

3.1.1 基于形态和分子系统学证据 密枝青藓 (*Brachythecium amnicola*. Müll. Hal.)、斜枝青藓 (*B. campylothallum* Müll. Hal.)、多枝青藓 (*B.*

fasciculirameum Müll. Hal.)、扁枝青藓 (*B. planiusculum* Müll. Hal.) 和绿枝青藓 (*B. viridefactum* C. Muell.) 被处理为多褶青藓 [*B. buechananii* (Hook.) A. Jaeger] 的异名。

3.1.2 *B. plumosum* var. *striato-plumosum* Dix & Sakuari 被处理为羽枝拟青藓 [*Sciuro-hypnum plumosum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen] 的异名(翟德逞, 2008)。

3.1.3 白色同蒴藓 [*Homalothecium leucodonticaule* (Müll. Hal.) Broth.] 被处理为无疣同蒴藓 (*H. laevisetum* Sande Lac.) 的异名 (Ignatov et al., 2005)。

3.2 存疑种

广西青藓科植物中的存疑种有下列两种情况: 前人文献中的部分物种的凭证标本已全部遗失, 或者只借阅到了部分凭证标本, 但这些标本均为错误鉴定。而对于未借阅到的凭证标本, 无法确定其物种名称。同时, 本研究查阅的所有广西青藓科植物中未见符合以上特征的标本, 所以, 这些种是否在广西有分布, 有待进一步研究。故本文暂将这些物种归为存疑种。

3.2.1 前人文献中的凭证标本已遗失的物种有勃氏青藓 (*Brachythecium brotheri* Paris) (汪楣芝和贾渝, 1993; 贾渝等, 1995; 谢强等, 2012b; 左勤等, 2010)、尖叶青藓 (*B. coreanum* Cardot) (贾渝等, 1995; 谢强等, 2013; 胡人亮和王幼芳, 2005; Hu et al., 2008; 汪楣芝和贾渝, 1993; 贾渝等, 1995)、羽状青藓 (*B. propinnatum* Redf., B. C. Tan & S. He) (祝爱琼等, 2000)、毛尖藓 [*Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout] (祝爱琼等, 2000; 谢强等, 2013)、狭叶美喙藓 (*Eurhynchium coarctum* Müll. Hal.) (蔡锦荣, 2016)、糙叶美喙藓 (*E. squarriifolium* Broth. ex Ihs.)、狭叶长喙藓 (*Rhynchostegium fauriei* Cardot) (左勤等, 2010)、长枝褶藓 [*Okamuraea hakoniensis* (Mitt) Broth.] (Wu & Crosby, 2002; 吴鹏程, 2002)。

3.2.2 前人文献中提到, 但本研究只借阅到了部分凭证标本, 这些标本均为错误鉴定的物种有褶叶青藓 [*Brachythecium salebrosum* (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.] (谢强等, 2012a,

2013;胡人亮和王幼芳,2005;Hu et al., 2008)、东亚青藓 [*B. trichomitrium* (Dixon et Thér.) Huttunen, Ignatov, Min. Li & Y. F. Wang] (左勤等, 2010)、绒叶青藓 [*B. velutinum* (Hedw.) Schimp.] (徐炳声, 1989; 胡人亮和王幼芳, 2005; Hu et al., 2008; 谢强等, 2013)。对于文献中提到的借阅到的标本, 其物种鉴定均为错误; 对于未借阅到的标本, 无法确定其物种。而在我们所查阅的所有广西青藓科植物中未见符合这些种特征的标本, 故这些种是否在广西有分布, 有待进一步研究, 暂归为存疑种。

3.3 排除种

对于前人文献中提到的部分物种, 经作者借阅凭证标本并逐一研究鉴定后确认为错误鉴定, 故本研究将这些种类排除出广西青藓科植物名录。这些物种有灰白青藓 [*Brachythecium albicans* (Hedw.) Schimp.] (谢强等, 2013)、冰川青藓 (*B. glaciale* Schimp.) (左勤等, 2010)、皱叶青藓 (*B. kuroishicum* Besch.) (谢强等, 2013)、野口青藓 (*B. noguchii* Takaki) (翟德逞, 2008; 谢强等, 2012a)、疣柄青藓 (*B. perscabrum* Broth.) (翟德逞, 2008; 左勤等, 2010)、青藓 (*B. pulchellum* Broth. & Paris) (谢强等, 2013)、钩叶青藓 (*B. uncinifolium* Broth. et Paris) (谢强等, 2013)、短尖美喙藓 [*Eurhynchium angustirete* (Broth.) T. J. Kop.] (左勤等, 2010)、尖叶美喙藓 [*E. eustegium* (Besch.) Dixon] (左勤等, 2010; 谢强等, 2012a)、斜蒴藓 [*Camptothecium lutescens* (Hedw.) Schimp.] (贾鹏等, 2010)、美丽长喙藓 [*Rhynchostegium subspeciosum* (Müll. Hal.) Müll. Hal.] (左勤等, 2010)、深绿褶叶藓 [*Palamocladium euchloron* (Bruch ex Müll. Hal.) Wijk & Margad.] (贾鹏等, 2010; 谢强等, 2012a)。

致谢 在本文完成过程中, 华东师范大学王幼芳教授、中科院植物所贾渝研究员和于宁宁博士、中科院沈阳应用生态研究所李薇博士、上海师范大学郭水良教授、贵州大学熊源新教授和曹威博士等提供了广西青藓科的相关标本供作者研究, 在此对各位前辈和同行的无私支持和帮助表示衷心的感谢!

参考文献:

- CAI JR, MA YH, YU J, et al., 2016. Newly recorded moss genus and species in Guangxi Autonomous Region of China based on collection from Huaping National Nature Reserve [J]. J Shanghai Norm Univ (Nat Sci Ed), 45 (5): 617–623. [蔡锦蓉, 麻亚鸿, 于晶, 等, 2016. 广西藓类植物新纪录 [J]. 上海师范大学学报 (自然科学版), 45 (5): 617–623.]
- GENG JT, 2015. A taxonomic study on *Brachythecium* s. l. of China [D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University. [耿江婷, 2015. 中国广义青藓属 (*Brachythecium* s. l.) 分类学研究 [D]. 石家庄: 河北师范大学.]
- HU RL, WANG YF, 2005. Flora Bryophytorum Sinicorum (Vol. 7) [M]. Beijing: Science Press: 82–182. [胡人亮, 王幼芳, 2005. 中国苔藓志 (第七卷) [M]. 北京: 科学出版社: 82–182.]
- HU RL, WANG YF, CROSBY, MR, et al., 2008. Moss flora of China (English version, Vol. 7) [M]. Beijing, New York: Science Press; Saint Louis: Missouri Botanical Garden Press: 71–167.
- IGNATOV MS, HUTTUNEN S, KOPONEN T, 2005. Bryophyte flora of Hunan Province, China. 5. Brachytheciaceae (Musci), with an overview of *Eurhynchiadelphus* and *Rhynchostegiella* in SE Asia [J]. Acta Bot Fenn, 178: 1–56.
- JIA Y, HE S, 2013. Species catalogue of China. Vol. 1 Plants, bryophytes [M]. Beijing: Science Press: 204–217. [贾渝, 何思, 2013. 中国生物物种名录. 第一卷 植物, 苔藓植物 [M]. 北京: 科学出版社: 204–217.]
- JIA Y, WU PC, LUO JX, 1995. The moss flora of Mt. Jiawan, Guangxi and its significance in dividing the boundary line between tropical and subtropical regions in China (Cont.) [J]. Acta Phytotax Sin, 33(6): 556–571. [贾渝, 吴鹏程, 罗健馨, 1995. 广西九万山藓类植物区系分析及其对划分热带、亚热带分界线的意义 (续) [J]. 植物分类学报, 33(6): 556–571.]
- JIA P, XIONG YH, WANG MH, et al., 2010. A study on the bryoflora on the Maojie Nature Reserve for bird in Guangxi Province [J]. J Guizhou Univ (Nat Sci Ed), 27(6): 55–62. [贾鹏, 熊源新, 王美会, 等, 2010. 广西猫街鸟类自然保护区苔藓植物初步研究 [J]. 贵州大学学报 (自然科学版), 27(6): 55–62.]
- LI M, MA J, IGNATOV MS, et al., 2015a. Taxonomic re-assessment of *Kindbergia* (Brachytheciaceae, Bryophyta) in China, with a description of *Pseudokindbergia* gen. nov. [J]. Cryptogamie, Bryol, 36(1): 47–68.
- LI M, WANG LB, WANG YF, 2015b. Status and prospect of Brachytheciaceae (Bryophyta) in China [J]. Chenia, 12: 1–13.
- LIU Q, 2010. Taxonomy and phylogeny of *Eurhynchium* and

Rhynchostegium based on morphological and molecular data in East Asia [D]. Shanghai: East China Normal University. [刘倩, 2010. 东亚地区美喙藓属 (*Eurhynchium*) 和长喙藓属 (*Rhynchostegium*) 植物形态学和分子系统学研究 [D]. 上海: 华东师范大学.]

SU ZM, LI XK, DING T, et al., 2014. The vegetation of Guangxi (Vol. 1) [M]. Beijing: Chinese Forestry Press. [苏宗明, 李先琨, 丁涛, 等, 2014. 广西植被 (第一卷) [M]. 北京: 中国林业出版社.]

WANG MZ, JIA Y, 1993. Higher plant catalogue of Jiowan Mountain (I) Bryophyta [M]//LI ZY, QIU XM. Reports on the plant resources of the Jiowan Mountains, Guangxi, China. Beijing: Chinese Forestry Press: 200–207. [汪楣芝, 贾渝, 1993. 九万山高等植物名录 (一) 苔藓植物 [M]//李振宇, 邱小敏. 广西九万山植物资源考察报告. 北京: 中国林业出版社: 200–207.]

WEI QQ, ZHANG BY, LI M, et al., 2018. Newly recorded species of mosses in Guangxi, China [J]. *Guihaia*, 38(3): 388–396. [魏倩倩, 章博远, 李敏, 等, 2018. 广西藓类植物新记录的报道 [J]. *广西植物*, 38(3): 388–396.]

WEI YM, TANG QM, HO BC, et al., 2018. An annotated checklist of bryophytes of Guangxi, China [J]. *Chenia*, 13(Special issue 1): 1–132.

WU PC, 2002. *Flora Bryophytarum Sinicorum* (Vol. 6) [M]. Beijing: Science Press. [吴鹏程, 2002. 中国苔藓志 (第六卷) [M]. 北京: 科学出版社.]

WU PC, CROSBY MR, 2002. *Moss flora of China* (English version, Vol. 6) [M]. Beijing: Science Press; Saint Louis: Missouri Botanical Garden Press.

XIE Q, WEI YM, XIE YJ, 2012a. The bryoflora of limestone regions in Sino-Vietnam border area in southwest Guangxi [M]//LIANG SC, MA JM. Research on animal and plant ecology of Guangxi, 2nd series. Beijing: Chinese Forestry Press: 3–17. [谢强, 韦玉梅, 谢彦军, 2012a. 桂西南中越边境石灰岩地区苔藓植物区系 [M]//梁士楚, 马姜明主编. 广西动植物生态学研究 (第二集). 北京: 中国林业出版社: 3–17.]

XIE Q, XU L, XIE YJ, et al., 2012b. Study on flora and ecological distribution of bryophytes in *Cathaya argyrophylla* natural communities of Huaping, Guangxi [M]//LIANG SC, MA JM. Research on animal and plant ecology of Guangxi, 2nd series. Beijing: Chinese Forestry Press: 18–23. [谢强, 徐丽, 谢彦军, 等, 2012b. 广西花坪银杉天然群落苔藓植物区系与生态分布的研究 [M]//梁士楚, 马姜明. 广西动植物生态学研究 (第二集). 北京: 中国林业出版社: 18–23.]

XIE Q, XIE YJ, KONG FM, et al., 2013. Studies on bryophytes species in Jingxi Co. and Napo Co. [M]//LIANG SC, MA JM. Research on animal and plant ecology of Guangxi, 3rd series. Beijing: Chinese Forestry Press: 84–100. [谢强, 谢彦军, 孔繁茂, 等, 2013. 靖西县和那坡县苔藓植物种类研究 [M]//梁士楚, 马姜明. 广西动植物生态学研究 (第三集). 北京: 中国林业出版社: 84–100.]

XU BS, 1989. Cryptogamic flora of the Yangtze Delta and adjacent regions [M]. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers: 347–357. [徐炳声, 1989. 长江三角洲及邻近地区孢子植物志 [M]. 上海: 上海科学技术出版社: 347–357.]

ZHAI DC, 2008. A taxonomic study on *Brachythecium* of East Asia [D]. Shanghai: East China Normal University. [翟德逞, 2008. 东亚青藓属植物分类学研究 [D]. 上海: 华东师范大学.]

ZHU AQ, ZHANG GC, XIE Q, 2000. The bryophytes in the Yinzhulaoshan mountain of Guangxi [J]. *J Guangxi Norm Univ (Nat Sci Ed)*, 18(3): 86–90. [祝爱琼, 张革昌, 谢强, 2000. 广西银竹老山的苔藓植物 [J]. *广西师范大学学报 (自然科学版)*, 18(3): 86–90.]

ZUO Q, LIU Q, WANG YF, 2010. Study on moss flora of Maoershan Nature Reserve, Guangxi [J]. *Guihaia*, 30(6): 850–858. [左勤, 刘倩, 王幼芳, 2010. 广西猫儿山自然保护区藓类植物区系研究 [J]. *广西植物*, 30(6): 850–858.]

附录 广西青藓科分类学修订名录

1 气藓属

Aerobryum Dozy et Molk., Ned. Kruidk. Arch. 2(4): 279. 1851.

气藓

Aerobryum speciosum Dozy et Molk., Ned. Kruidk. Arch. 2(4): 280. 1851.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 那坡县德孚自然保护区: 韦玉梅等

20141203–47 (HSNU)。那坡县: 韦玉梅 20141206–60 (HSNU); 贾鹏等 *NPPH100510027*, *NPPH100510024*, *NPPH100510030*, *NPPH100510036*, *NPPH100510061*, *NPPH100510073* (GACP)。猫儿山自然保护区: 王幼芳、左勤 702, 1113, 1188, 1352 (HSNU); 唐启明 20180508–364; 唐启明、韦玉梅、何思 20180908–112; 何思、韦玉梅 48703。金秀县大瑶山国家级自然保护区: 唐启明 20180515–642, 20180506–2064。

分布: 中国广西百色市、来宾市、桂林市; 中国 (西藏、四川、云南、重庆、贵州、湖北、湖南、广西、海南、江西、台湾), 印

度,斯里兰卡,不丹,越南,泰国,老挝,菲律宾,印度尼西亚,日本,巴布亚新几内亚。

2 青藓属

Brachythecium Schimp., Bryol. Eur. 6: 5. 1853.

2.1 多褶青藓

Brachythecium buchananii (Hook.) A. Jaeger, Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876 - 77: 341 (Gen. Sp. Musc. 2: 1159). 1878.

Hypnum buchananii Hook., Trans. Linn. Soc. London 9: 320. 28 f. 3. 1808.

Brachythecium amnicola Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 3: 125. 1896.

Brachythecium campylothallum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 3: 124. 1896.

Brachythecium fasciculirameum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 4: 269. 1897.

Brachythecium perminuscolum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 5: 200. 1898.

Brachythecium planiusculum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 4: 268. 1897.

Brachythecium thraustum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 5: 270. 1897.

Brachythecium viridefactum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 4: 270. 1897.

Brachythecium yunnanense Herzog, Hedwigia 65: 167. 1925.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 隆林县: 韦玉梅 8-335, 8-349, 8-359。隆林县大哄豹自然保护区: 韦玉梅 8-118B。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20181003-364A, 20181001-178。乐业县: 唐启明 20140608-149, 20180411-217, 20180411-221, 20180409-70; 唐启明、张仕艳 20181002-264; 20181003-354A。天峨县令当山: 赖明洲 KS89-419a, KS89-421 (PE)。天峨县: 龙光日、张灿明等 167a, 赖明洲 KS89-80 (PE)。龙胜县: 郭水良、于晶 110620002 (HSNU)。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、刘倩 681; 王幼芳、左勤 167, 328, 346, 358, 601, 617, 619, 623, 682, 684, 698, 717, 720, 739, 1363, 1369, 1370, 1918 (HSNU); 赵芳芳 865 (PE); 何思、韦玉梅 48616, 48600。那坡县白云山老虎跳自然保护区: 韦玉梅 10-305, 10-335, 10-707, 10-776。那坡县: 裴林英 2154, 2183, 2186, 2524, 2529, 2540, 2581 (PE), 2596; 谢强等弄内 14, 弄莫 06, 水弄 04; 韦玉梅等 20141204-94, 20141205-67), 20141206 - 17 (HSNU); 贾鹏等 *NPPH100510076*,

NPPH100510137, *NPPH100510184* (GACP)。靖西县: 韦玉梅 5-316A; 谢强等 灵光 17, 红山 14。靖西县邦亮自然保护区: 韦玉梅 5-313, 8-527, 8-544。金秀县大瑶山国家级自然保护区: 唐启明 20180504057。

分布: 中国广西百色市、河池市、来宾市、桂林市; 中国(新疆、西藏、青海、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、陕西、山西、河北、北京、河南、山东、四川、重庆、湖北、安徽、江苏、上海、云南、贵州、湖南、江西、浙江、广西、广东、福建、台湾), 俄罗斯, 不丹, 朝鲜, 日本, 老挝, 缅甸, 泰国, 越南, 尼泊尔, 斯里兰卡, 巴基斯坦。

2.2 台湾青藓

Brachythecium formosanum Takaki, J. Hattori Bot. Lab. 15: 2. 1955.

种的特征描述: 参见翟德逞, 2008。

标本鉴定 西林县猫街自然保护区: 贾鹏 *XMLJ091020009* (GACP)。

分布: 中国广西百色市; 中国(西藏、内蒙古、吉林、辽宁、宁夏、陕西、河北、四川、重庆、贵州、安徽、江苏、湖南、江西、浙江、云南、广西、广东、台湾), 日本, 尼泊尔。

2.3 圆枝青藓

Brachythecium garovaglioides Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 4: 270. 1897.

种的特征描述: 参见翟德逞, 2008。

标本鉴定 乐业县: 唐启明 20180413-427, 20180417-838。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20181001-163, 20181001-219, 20181003-346。西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 *NZ100506067*, *NZ100506253*, *NZ100507010*, *NZ100507013*, *NZ100507028*, *NZ100507040*, *NZ100507062*, *NZ100507067*, *NZ100507072*, *NZ100507074*, *NZ100507092*, *XLNZ091019049* (GACP)。西林县: 贾鹏等 *XLMB091021058*, *XLMB091021085*, *XLMB091021152* (GACP)。那坡县白云山: 韦玉梅 20140916-12, 10-668, 10-725。那坡县: 王健等 20130816-54, 20130816-56, 20130818-80 (HSNU); 韦玉梅等 20141206-12 (HSNU); 裴林英 2351 (PE); 贾鹏等 *NP091024077*, *NPPH100510165* (GACP)。那坡县德孚自然保护区: 贾鹏等 *NPDF091025031* (GACP)。靖西县: 谢强等 果巴 26, 红山 01, 马峒 07; 韦玉梅 8-456A, 20140914-25。大新县恩城国家自然保护区: 唐启明 20180113-152, 20180113-154B, 20180113-163, 20180113-165。武鸣县大明山国家自然保护区: 唐启明 20181106-104, 20181107-133。龙州县炮台山: 韦玉梅 5-444A, 5-445, 5-447, 10-162。鹿寨县: 龙日光 91007b (PE)。金秀县大瑶山国家级自然保护区: 唐启明 20180507297。

分布: 中国广西百色市、崇左市、南宁市、柳州市、来宾市; 中国(新疆、西藏、内蒙古、吉林、甘肃、陕西、山东、四川、

湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、云南、重庆、贵州、广西、广东、福建、香港、台湾), 俄罗斯(远东地区, 阿尔泰山), 朝鲜, 韩国, 日本, 缅甸, 尼泊尔, 巴基斯坦, 印度, 不丹。

2.4 灰青藓

Brachythecium glauculum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 5: 199. 1897.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 猫儿山自然保护区: 王幼芳、左勤 2007715850 (HSNU)。

分布: 中国广西桂林市; 中国特有(陕西、上海、贵州、广西)。

2.5 粗枝青藓

Brachythecium helminthocladum Broth. & Paris, Rev. Bryol. 31: 63. 1904.

种的特征描述: 参见翟德逞, 2008。

标本鉴定 猫街自然保护区: 贾鹏等 *XLMJ091021133* (GACP)。

分布: 中国广西百色市; 中国(内蒙古、黑龙江、辽宁、陕西、山东、河南、四川、云南、贵州、湖南、安徽、浙江、广西、台湾), 日本。

2.6 同枝青藓

Brachythecium homocladum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 3: 126. 1896.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 翟德逞, 2008。

标本鉴定 天峨县: 龙光日、张灿明等 187*b* (PE)。

分布: 中国广西河池市; 中国特有(辽宁、陕西、湖北、安徽、江西、广西)。

2.7 柔叶青藓

Brachythecium moriense Besch., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 7, 17: 375. 1893.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 猫儿山自然保护区: 王幼芳、刘倩 681, 1569; 刘倩、左勤 672 (HSNU)。

分布: 中国广西桂林市; 中国(西藏、黑龙江、吉林、陕西、山西、河北、四川、贵州、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、云南、广东、广西、香港), 日本。

2.8 燕尾青藓

Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) A. Jaeger, Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876 – 77: 328 (Gen. Sp. Musc. 2: 328). 1878.

Hypnum novae-angliae Sull. & Lesq., Manual (ed. 2) 676–677. 1856.

Bryhnia novae-angliae (Sull. & Lesq.) Grout, Bull. Torrey Bot. Club 25(5): 229. 1898.

种的特征描述: 参见 Noguchi, 1991; 胡人亮和王幼芳, 2005; 李敏, 2004。

标本鉴定 武鸣县大明山国家自然保护区: 唐启明 20181105–164。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 1640 (HSNU); 何思、韦玉梅 48586。金秀县大瑶山国家级自然保护区: 唐启明 20180515–661。

分布: 中国广西南宁市、来宾市、桂林市; 中国(新疆、西藏、吉林、陕西、山西、甘肃、河北、山东、上海、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、福建、四川、贵州、重庆、云南、广西), 日本, 欧洲, 北美洲, 巴基斯坦。

2.9 悬垂青藓

Brachythecium pendulum Takaki, J. Hattori Bot. Lab. 15: 27. 1955.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 那坡县: 贾鹏 *NPPH100510125* (GACP)。

分布: 中国广西百色市; 中国(河北、安徽、江西、浙江、湖南、四川、贵州、重庆、福建、广西), 日本。

2.10 华北青藓

Brachythecium pinnirameum Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 3: 126. 1896.

Brachythecium camptothecioides Takaki, J. Hattori Bot. Lab. 15: 4, f. 9, 1–7. 1955.

种的特征描述: 参见 Noguchi, 1991; 翟德逞, 2008; 胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 1379 as *Brachythecium camptothecioides* (HSNU)。

分布: 中国广西桂林市; 中国(新疆、西藏、宁夏、陕西、山东、河南、浙江、安徽、福建、四川、贵州、云南、广西), 日本。

2.11 毛尖青藓

Brachythecium piligerum Cardot, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 3: 290. 1911.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 那坡县: 贾鹏 *NPPH100510162* (GACP)。

分布: 中国广西百色市; 中国(内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、北京、山东、西藏、四川、贵州、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、云南、广西), 日本。

2.12 匍枝青藓

Brachythecium procumbens (Mitt.) A. Jaeger, Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876 – 77: 341 (Gen. Sp. Musc. 2: 409). 1878.

Hypnum procumbens Mitt., J. Proc. Linn. Soc., Bot., Suppl. 1: 70. 1859.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 翟德逞, 2008。

标本鉴定 乐业县: 唐启明、张仕艳 20181001–213。

分布:中国广西百色市;中国(新疆、陕西、山西、河北、江苏、浙江、西藏、四川、贵州、江西、云南、广西、台湾),韩国,日本,印度,尼泊尔,斯里兰卡。

2.13 溪边青藓

Brachythecium rivulare Schimp., Bryol. Eur. 6: 17. pl. 546 (fasc. 52–56. Monogr. 13. pl.12). 1853.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 翟德逞, 2008。

标本鉴定 乐业县:唐启明 20180409–52。天峨县:龙光日、张灿明 190 (PE)。

分布:中国广西百色市、河池市;中国(新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、陕西、山西、北京、河北、河南、山东、西藏、四川、湖北、湖南、安徽、浙江、云南、广西、贵州、重庆、福建、台湾)以及亚洲其他国家,欧洲,俄罗斯,北美洲,南美洲。

2.14 长叶青藓

Brachythecium rotaeanum De Not., Comment. Soc. Crittog. Ital. 2(3): 285–286. 1867.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 西林县:贾鹏 *XLMB091021240* (GACP)。

分布:中国广西百色市;中国(吉林、陕西、四川、重庆、湖南、安徽、浙江、云南、贵州、广西),欧洲,俄罗斯,日本,北美洲。

2.15 卵叶青藓

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 15. pl. 543 (fasc. 52–56 Monogr. 11. pl. 9). 1853.

Hypnum rutabulum Hedw., Sp. Musc. Frond. 276. 1801.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 翟德逞, 2008。

标本鉴定 乐业县:唐启明 20180411–296, 20180609–209。靖西县:韦玉梅 8–756。龙州县弄岗国家级自然保护区:韦玉梅 5–644*B*。上思县十万大山国家级自然保护区:王幼芳等 2014176 (HSNU)。龙胜县:赵芳芳 882 (PE)。西林县:贾鹏 *XLMB091021209* (GACP)。

分布:中国广西百色市、崇左市、防城港市、桂林市;中国(新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、宁夏、陕西、河北、北京、山东、西藏、青海、四川、贵州、重庆、湖北、湖南、浙江、安徽、江苏、云南、广西、台湾),欧洲,俄罗斯(西伯利亚),日本,巴基斯坦,阿尔及利亚,巴布亚新几内亚,澳大利亚,高加索地区,新西兰,哈萨克斯坦,坦桑尼亚,智利,叙利亚。

3 美喙藓属

Eurhynchium Schimp., Bryol. Eur. 5: 217. 1854.

扭尖美喙藓

Eurhynchium kirishimense Takaki, J. Hattori Bot. Lab. 16: 34. 41 f. 1–10. 1956.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 刘倩, 2010。

标本鉴定 龙胜县:郭水良、于晶 110620166 (SHNU)。

分布:中国广西桂林市;中国(辽宁、陕西、山西、湖南、四川、贵州、云南、福建、广西、广东),日本。

4 同蒴藓属

Homalothecium Schimp., Bryol. Eur. 5: 91. 1851.

无疣同蒴藓

Homalothecium laevisetum Sande Lac., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 298. 1866; Wang in Wu, Bryofi. Hengduan Mts. 592. 2000.

Homalothecium leucodonticaule (Müll. Hal.) Broth., Nat. Pfl. 1(3): 1135. 1908.

Ptychodium leucodonticaule Müll. Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. ser. 4: 268. 1897.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 西林县:贾鹏等 *XLMB091021242* (GACP)。乐业县:唐启明 20180409–39, 20180411–211, 20180411–222, 20180413–344, 20180414–488, 20180415–644, 20180416–774, 20180416–775, 20180607–62, 20180609–161。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区:唐启明、张仕艳 20181001–112, 20181007–536。天峨县:李振宇 90027 (PE)。天峨县令当山:赖明洲 *KS*–89–401 (PE)。那坡县:谢强等 龙合 11, 弄慢 08, 弄慢 15, 弄旺 19; 韦玉梅 5–337, 5–341*B*, 5–347, 5–352*A*, 5–356; 裴林英 2192。那坡县老虎跳自然保护区:韦玉梅 10–281。靖西县:谢强等 冻和 25, 足峙 17, 坡院 06, 三合 27, 巴留 07, 足峙 18, 岳圩 21; 韦玉梅 5–293*A*, 8–648*A*, 8–742*B*。靖西县邦亮自然保护区:韦玉梅 8–504, 1866。靖西县古文水源林保护区:韦玉梅 8–716, 8–742*B*。百色市大哄豹自然保护区:韦玉梅 1514。大新县恩城国家自然保护区:唐启明 20180113–94, 20180113–104*A*, 20180113–105*B*, 20180113–132, 20180115–222, 20180115–233, 20180115–235*B*, 20180115–244。大新县下雷水源林保护区:韦玉梅 10–204; 裴林英 2099, 2133, 2140。隆安县屏山:韦玉梅 5–133, 5–134*A*, 5–148*D*, 5–154*C*, 5–156*B*。隆林县大哄豹自然保护区:韦玉梅 5–106*A*, 8–113*A*, 8–114。龙州县八更山:章博远等 2014632, 2014633, 2014629*E* (HSNU)。凭祥市大连城景区:韦玉梅 5–718*B*; 5–735*C*。

分布:中国广西百色市、崇左市、河池市、南宁市;中国(新疆、西藏、甘肃、陕西、辽宁、河北、山东、河南、四川、湖北、湖南、重庆、贵州、安徽、江苏、上海、浙江、江西、云南、福建、广东、广西),日本,朝鲜。

5 鼠尾藓属

Myuroclada Besch., Ann. Sci. Nat., Bot., Sér. 7. 17(6): 379–380. 1893.

5.1 羽枝鼠尾藓

Myuroclada longiramea (Müll. Hal.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & Huttunen, J. Bryol. 36(1): 15. 2014.

Eurhynchium longirameum (Müll. Hal.) Y. F. Wang & R. L. Hu, Acta Phytotax. Sin. 41(3): 277. 2003.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 融水县九万大山; 汪楣芝 46391a。猫儿山国家自然保护区; 王幼芳、左勤 1936 as *Eurhynchium angustirete* (HSNU)。

分布: 中国广西柳州市、桂林市; 中国(新疆、吉林、辽宁、陕西、河北、广西), 东欧, 阿尔泰, 西伯利亚南部, 雅库蒂亚, 俄罗斯远东, 堪察加半岛和科曼多尔群岛至普里莫尔斯基领土和库页岛, 日本(稀少)。

5.2 鼠尾藓

Myuroclada maximowiczii (G. G. Borshch.) Steere & W. B. Schofield, Bryologist 59: 1. 1956.

Hypnum maximowiczii G. G. Borshch., Prim. Fl. Amur. 467. 1859.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 上思县: 高谦 2036(GXMG);

分布: 中国广西防城港市; 中国(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、陕西、山西、山东、江苏、上海、浙江、四川、重庆、湖南、江西、云南、广西), 朝鲜, 日本, 俄罗斯, 欧洲, 北美洲。

6 尖喙藓属

Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst., Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, Laubmoose 2: 781. 1905.

6.1 卵叶尖喙藓

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Länder 49: 59. 1907.

Hypnum hians Hedw., Species Muscorum Frondosorum 272. pl. 70: f. 11–14. 1801.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 隆林县百色市大哄豹自然保护区: 韦玉梅 1501。乐业县: 唐启明 20171018–009, 20171018–025, 20171018–029, 20171018–030B, 20171018–032, 20171021–019B, 20171021–019b, 20171021–020, 20180409–46, 20180411–281, 20180411–294, 20180415–524, 20180415–560, 20180415–569, 20180415–581, 20180415–595, 20180415–648, 20180808–145; 唐启明、张仕艳 20181002–245。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20181004–431A, 20181005–

493, 20181007–563。那坡县: 王健等 20130816–14 (HSNU); 贾鹏等 NP091024136 (GACP)。那坡县德孚自然保护区: 贾鹏等 NP091024136, NP091025051, NP091025052 (GACP)。靖西县: 韦玉梅等 20141207–26 (HSNU)。大新县: 韦玉梅等 20141208–31 (HSNU)。大新县恩城国家自然保护区: 唐启明 20180112–69B, 20180115–243。上思县十万大山: 2014179–a, 2014180A (HSNU)。罗城县九万山: 龙光日、张灿明 L–89028 as *Eurhynchium savatieri*, L–89034 (PE)。融水县九万大山: 贾渝 J49–b (PE); 何小兰 H–00140 as *Eurhynchium savatieri* (PE)。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 263, 321, 325, 676, 1316–2, 1672, 1675–1, 1913, 1973 (HSNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、河池市、柳州市、桂林市; 中国(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、山东、河南、四川、贵州、湖南、湖北、江苏、浙江、江西、云南、福建、广西、广东、香港), 日本, 巴基斯坦, 不丹, 尼泊尔, 高加索地区, 喀麦隆, 坦桑尼亚, 科特迪瓦, 北美洲。

6.2 阔叶尖喙藓

Oxyrrhynchium latifolium (Cardot) Podp., Spisy Pírodov decké Fakulty University v Brn 116: 33. 1929.

Eurhynchium latifolium Cardot, Beihefte zum Botanischen Centralblatt 17: 35. 21. 1904.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 乐业县: 唐启明 20171020–064, 20171021–010, 20180409–34, 20180409–75, 20180413–436, 20180416–735, 20180609–199, 20180609–202, 20180609–203。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20181001–210, 20181008–608。靖西县: 韦玉梅 8–389A。龙州县弄岗国家级自然保护区: 韦玉梅 5–654A。上思县十万大山: 2014183 (HSNU)。融水县: 龙光日 91075a (PE)。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 1317 as *Eurhynchium longirameum* (HSNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、柳州市、桂林市; 中国(贵州、浙江、广东、广西), 朝鲜, 韩国, 日本。

6.3 疏网尖喙藓

Oxyrrhynchium laxirete (Broth.) Broth., Die natürlichen Pflanzenfamilien, Zweite Auflage 11: 377. 1925.

Eurhynchium laxirete Broth., Bulletin de la Société Botanique de Genève 4: 380. 1912.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 乐业县: 唐启明 20171018–017, 20171018–021, 20171019–007, 20171019–012, 20171019–019B, 20171019–021, 20171019–027B, 20171019–034, 20171019–063, 20171019–071, 20171020–017, 20171020–020, 20171020–058, 20171020–074C, 20171021–008, 20171021–025, 20171021–050, 20171021–061, 20171023–009D, 20171024–010, 20171033–033, 20180410–146, 20180411–177, 20180411–178B, 20180411–179, 20180411–180, 20180411–195, 20180411–227, 20180411–235, 20180411–238, 20180411–257A, 20180411–265, 20180413–320, 20180413–322, 20180413–323, 20180413–326, 20180413–346, 20180413–348, 20180413–349, 20180413–351, 20180413–355, 20180413–

376, 20180413-408, 20180414-470, 20180414-484, 20180415-528, 20180415-561, 20180415-562, 20180415-574, 20180415-580, 20180415-653, 20180416-708, 20180416-758, 20180417-806, 20180417-817, 20180607-1, 20180607-15, 20180607-26, 20180607-30, 20180607-33, 20180808-076, 20180809-83A, 20180809-95, 20180809-98; 唐启明、张仕艳 20181002-244。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明 20181001-176, 唐启明、张仕艳 20180930-23。西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 NZ100506010, NZ100506030, NZ100506065, NZ100506073, NZ100506074, NZ100506076, NZ100506079, NZ100506080, NZ100506101, NZ100506110, NZ100506121, NZ100506129, NZ100506130, NZ100506131, NZ100506139, NZ100506184, NZ100506210, NZ100506212, NZ100506229, NZ100507008, NZ100507042, NZ100507075 (GACP)。西林县: 贾鹏等 *XLMB091021005*, *XLMB091021090*, *XLMB091021086*, *XLMB091021253* (GACP)。西林县猫街自然保护区: 贾鹏等 *XMLJ091020086*, *XMLJ091020114*, *XMLJ091020144* (GACP)。那坡县: 谢强等 红山 12, 红山 14, 坡马屯 15, 牛郎坡 13; 韦玉梅 20141206-37; 贾鹏等 *NP091024007*, *NP091024159* (GACP)。那坡县老虎跳自然保护区: 韦玉梅 10-409, 10-452, 10-484, 10-604, 10-708。那坡县德孚自然保护区: 贾鹏等 *NP091025014* (GACP)。靖西县: 韦玉梅 5-299, 20140912-7, 20140914-1; 谢强等 永兴 41, 红山 11; 20141207-14 (HSNU)。靖西县古文水源林保护区: 韦玉梅 8-725*B*。靖西县邦亮自然保护区: 韦玉梅 8-528, 8-541*C*, 1888 (PE)。大新县恩城国家自然保护区: 唐启明 20180115-220, 20180116-262*C*。大新县: 韦玉梅 5-207, 5-216, 5-220; 王健等 20130813-32 (HSNU)。大新县下雷水源林保护区: 韦玉梅 5-406*A*, 5-407*A*, 10-219, 10-223。隆安县龙虎山自然保护区: 韦玉梅 5-94。武鸣县三十六弄-陇均自然保护区: 韦玉梅 5-25*A*, 5-46-5-52。龙州县: 韦玉梅 5-514*A*, 5-562, 5-748*A*; 章博远等 2014541*B* (HSNU); 吴鹏程、林尤兴等 1299 (PE)。龙州县炮台山: 韦玉梅 5-459, 20140921-7。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远等 2014704, 2014708, 2014717, 2014719, 2014721*B*, 2014723, 2014739, 2014757 (HSNU); 韦玉梅 5-574*B*, 5-591*A*, 5-642, 5-696; 裴林英 1858 (PE); 章博远 2014711 (HSNU)。龙州县大青山: 韦玉梅 10-66。宁明县: 章博远等 2014546, 2014548, 2014545 (HSNU)。凭祥市小连城景区: 韦玉梅 10-30。防城港市: 章博远等 2014508 (HSNU)。防城城区: 章博远等 2014514 (HSNU)。融水县九万大山: 汪楣芝 46293-*b* (PE); 20180415-656; 20180808-148*B*; 20171021-029。桂林市临桂区花坪国家级自然保护区: 何思、韦玉梅 48888。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 1606, 1673, 1678, 1681 (HSNU)。

分布:中国广西百色市、崇左市、防城港市、南宁市、柳州市、桂林市;中国(西藏、陕西、山东、四川、重庆、贵州、湖南、湖北、江苏、浙江、上海、安徽、江西、云南、福建、广西、广东、海南),朝鲜,韩国,日本。

6.4 密叶尖喙藓

Oxyrrhynchium savatieri (Schimp. ex Besch.) Broth.,

Nat. Pflanzenfam. I(3) : 1154.1909.

Eurhynchium savatieri Schimp. ex Besch., Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 7, 17: 378. 1893.

Eurhynchium protractum Müll. Hal., Nuovo Giornale Botanico Italiano, new series 3: 124. 1896.

Rhynchostegium gracilescens Broth., Symbolae Sinicae 4:
108. 1929.

种的特征描述:参见刘倩,2010。

标本鉴定 那坡县:韦玉梅 10-779。

分布:中国广西百色市;中国(新疆、西藏、青海、内蒙古、黑龙江、陕西、山西、山东、河南、江苏、上海、浙江、江西、安徽、湖南、湖北、四川、贵州、重庆、云南、广西、广东、香港、台湾),朝鲜,韩国,日本,大洋洲(瓦努阿图)。

6.5 泛生尖喙藓

Oxyrrhynchium vagans (A. Jaeger) Ignatov & Huttunen,
Arctoa 11: 273. 2002.

Rhynchostegium vagans A. Jaeger, Ber. Thätigk. Gallischen Naturwiss. Ges. 1867-1877; 369. 1878.

种的特征描述:参见 Ignatov, 2005。

标本鉴定 靖西县:韦玉梅等 20141208-18。猫儿山国家级自然保护区:王幼芳、左勤 356 (HSNU)。

分布:中国广西百色市、桂林市;中国(安徽、浙江、四川、贵州、湖南、云南、广西、台湾),印度,尼泊尔,巴基斯坦,缅甸,越南,泰国,斯里兰卡,老挝,马来西亚,印度尼西亚,菲律宾,美国(夏威夷)。

7 褶叶藓属

Palamocladium Müll. Hal., Flora 82: 465–466. 1896.

褶叶藓

Palamocladium leskeoides (Hook.) E. Britton, Bull. Torrey Bot. Club 40: 673, 1931.

Hookeria leskeoides Hook., Musci Exot., vol. 1, pl. 55, 1818.

Isoethecium nilgeheniense Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 17: 246. 1842.

Palamocladium nilgheriense (Mont.) Müll. Hall., Flora 82:
465. 1896.

种的特征描述:参见胡人亮和王幼芳,2005。

标本鉴定 隆林县大哄豹自然保护区:韦玉梅 8-150, 8-238;隆林县:韦玉梅 8-342, 8-348, 1528, 1538, 1593, 1594 (PE);章博远 2013817-26。天峨县:张灿明 *T*-008 (PE);龙光日、张灿明等 187*c*, 191-*a* (PE);赖明洲 KS89-235 (PE)。那坡县:裴林英 2201, 2205, 2227, 2236, 2343, 2395, 2400, 2402, 2445, 2456, 2357, 2475, 2478, 2582, 2595, 2598 (PE);王健等 20130817-13, 20130817-25 (HSNU);韦玉梅等 20141204-106, 20141204-132, 10-526;谢强等 规等 17, 龙合 08, 牛郎坡 11, 水弄 11。那坡县老虎跳自然保护区:韦玉梅 10-270, 10-345, 10-

354, 10-413, 10-435, 10-443, 10-444, 10-451, 10-526, 10-550, 10-601, 10-661, 10-735, 10-778。靖西县: 韦玉梅 20140916-54, 5-323, 5-332, 8-463*B*, 8-666, 8-688; 谢强等 果巴 27; 裴林英 2739, 2746, 2582。靖西县古文水源林保护区: 韦玉梅 8-704, 8-719*A*, 8-723*A*, 8-730*A*, 8-743*A*。靖西县底定自然保护区: 谢强等 样 5*D*2-001, 样 5*D*5-001, 样 5*E*4-001, 样 5*E*5-001。宁明县十万大山国家级自然保护区: 章博远等 2014373*A* (HSNU), 20140418。融水县九万大山: 贾渝 00115 (PE)。融水苗族自治县: 龙光日 91085-*a* (PE); 贾渝 00113 (PE); 汪楣芝 46432-*a* (PE)。龙胜县: 金鑑明、胡舜士 521-*B*, 496 (PE)。猫儿山国家自然保护区: 刘倩、左勤 1389 (HSNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市、河池市、柳州市、桂林市; 中国(新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、河北、上海、江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、四川、贵州、重庆、云南、广西、福建、台湾), 朝鲜, 日本, 印度, 印度尼西亚, 越南, 菲律宾, 哥斯达黎加, 新西兰, 西印度群岛, 危地马拉, 阿根廷, 巴西, 秘鲁, 玻利维亚, 哥伦比亚, 厄瓜多尔, 美国, 委内瑞拉, 埃塞俄比亚, 索马里, 乌干达, 肯尼亚, 坦桑尼亚, 卢旺达, 南非, 马达加斯加, 斯威士兰。

8 拟异叶藓属

Pseudokindbergia Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & B. C. Tan, Cryptog. Bryol. 36(1): 61. 2015.

拟异叶藓

Pseudokindbergia dumosa (Mitt.) Min Li, Y. F. Wang, Ignatov & B. C. Tan, Cryptog. Bryol. 36(1): 61. 2015.

Hypnum dumosa Mitt., J. Linn. Soc. Bot. Suppl. 1: 80. 1859.

Kindbergia dumosa (Mitt.) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11: 263. 2002.

Eurhynchium serricuspis Müll Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s., 5: 197. 1898.

Bryhnia serricuspis (Müll Hall.) Y. F. Wang & R. L. Hu, Acta Phytotax. Sin. 41: 272. 2003.

Rhynchostegium divaricatifolium Renauld & Cardot, Bulletin de la Société Botanique de Belgique 41(1): 91. 1905.

种的特征描述: 参见 Li et al., 2015a。

标本鉴定 融水县: 汪楣芝 46939 (PE) as *Brachythecium brotheri*。龙胜县: 郭水良、于晶 110619523 (SHNU)。猫儿山国家自然保护区: 刘倩、左勤 965, 刘倩、朱永清、王幼芳 609, 1684 (HSNU)。

分布: 中国广西柳州市、桂林市; 中国(甘肃、陕西、西藏、四川、重庆、湖南、云南、广西、台湾), 印度, 尼泊尔, 不丹。

9 细喙藓属

Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr., Laubm. Deutschl. 3:

207. 1896.

9.1 日本细喙藓

Rhynchostegiella japonica Dix. et Thér., Rev. Bryol. n. ser. 4: 167. 1932.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 靖西县: 韦玉梅 8-625*B*, 5-308; 胡舜士 *Q*-7 (PE)。大新县: 韦玉梅 5-15, 5-202, 5-206*A*, 5-437*A*。大新县恩城国家自然保护区: 唐启明 20180504-40。龙州县: 章博远 2014660; 韦玉梅 5-469*A*, 5-477, 5-527*A*。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远 2014737*B* (HSNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市; 中国(新疆、陕西、湖南、贵州、重庆、云南、广西、广东), 日本。

9.2 光柄细喙藓

Rhynchostegiella laeviseta Broth., Symb. Bin. 4: 109. 1929; Wang et al., Acta Phytotax. Sin. 36(3): 264. 1998.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 龙州县弄岗国家级自然保护区: 王健等 20130812-26, 20130812-34, 20130812-50, 20130812-70*A* (HSNU); 章博远 2014727 (HSNU); 裴林英 1793 (PE)。

分布: 中国广西崇左市; 中国特有(新疆、陕西、贵州、重庆、湖南、江西、浙江、云南、广西)。

9.3 细肋细喙藓

Rhynchostegiella leptoneura Dix. & Thér., Rev. Bryol., n. s. 4: 168. 1932.

种的特征描述: 参见 Ignatov, 2005。

标本鉴定 靖西县: 韦玉梅 8-574。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远 2014700, 韦玉梅等 20140422-65, 20140422-65*A* (HSNU)。龙州县: 章博远 20140423-31*G* (HSNU); 韦玉梅 5-601*B*。防城港市十万大山国家级自然保护区: 唐启明等 20181112-143。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市; 中国特有(内蒙古、吉林、辽宁、山东、四川、贵州、云南、广西、台湾)。

9.4 锐尖细喙藓

Rhynchostegiella menadensis (Sande Lac.) E. B. Bartram, Philipp. J. Sci. 68: 302. 1933.

Hypnum menadense Sande Lac., Bryol. Jav. 2: 156, tab. 255. 1866.

H. fissidentoides Broth., Bot. Jahrb. 17: 479. 1893, hom. Illeg.

Rhynchostegium menadense (Sande Lac.) A. Jaeger, Ber. S. Gall. Thät. Naturw. Ges. 1876-77: 371. 1878 (Ad. 2: 437)。

Rhynchostegium fissidentoides Paris, Ind. Bryol. 1128. 1898.

种的特征描述: 参见 Ignatov, 1999。

标本鉴定 大新县: 韦玉梅 10-253。隆安县: 韦玉梅 5-96。武鸣县: 韦玉梅 5-30, 5-37, 5-43*A*。龙州县: 章博远 20140422-65*D*, 20140423-31 (HSNU); 韦玉梅 5-575。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远 2014685*A*, 2014710, 2014713, 2014722, 2014725, 2014741, 2014754, 2014756 (HSNU); 王健等

20130811–32, 20130812–70 (HSNU); 裴林英 1781 (PE)。防城港市防城区: 章博远 2014454 (HSNU)。大新县恩城国家自然保护区: 唐启明 20180113–155。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、南宁市; 中国(湖南、广西), 菲律宾。

9.5 华东细喙藓

Rhynchostegiella sinensis Broth. & Paris, Rev. Bryol. 35: 1908.

种的特征描述: 参见 Ignatov, 2005。

标本鉴定 那坡县: 王健等 20130817–124, 20130817–126 (HSNU)。

分布: 中国广西百色市; 中国特有(上海、江苏、浙江、广西)。

10 长喙藓属

Rhynchostegium Schimp., Bryol. Eur. 5: 197. 1852.

10.1 西里伯长喙藓

Rhynchostegium celebicum (Sande Lac.) A. Jaeger, Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1876–77: 374. 1878.

Hypnum celebium Sande Lac., Bryologia Javanica 2: 159. 1866.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20180930–36。西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 NZ100506075, NZ100506168, NZ100506196, NZ100506202, NZ100506232 (GACP)。西林县: 贾鹏等 XLMB091021010, XLMB091021239 (GACP)。西林县猫街自然保护区: 贾鹏等 XLMJ061020069, XLMJ091020080, XLMJ091020135, XLMJ091020136 (GACP)。那坡县老虎跳自然保护区: 韦玉梅采集号无。那坡县: 谢强等 百埃 18。靖西县邦亮国家级保护区: 王健等 20130815–112 (HSNU); 韦玉梅 8–601, 8–635, 10–251。大新县下雷水源林保护区: 韦玉梅 10–211。大新县: 韦玉梅 5–208, 10–238; 靖西县: 韦玉梅 8–600A, 8–758A, 8–763, 8–769, 8–776。武鸣县: 韦玉梅 5–34。武鸣县大明山国家自然保护区: 唐启明 20181105–124。龙州县大青山: 章博远等 2014564 (HSNU)。龙州弄岗国家自然保护区: 韦玉梅 5–675。龙州县: 韦玉梅 5–534, 5–536A, 5–537, 5–538。十万大山: 郭水良、于晶 无采集号, a531 (SHNU)。上思县十万大山: 唐启明 20181113–214。防城区十万大山国家级自然保护区: 唐启明等 20181112–164A。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、南宁市; 中国(四川、贵州、云南、广西、广东、台湾、海南), 印度, 印度尼西亚, 苏门答腊, 越南, 菲律宾, 巴布新几内亚, 马来西亚, 美国(夏威夷)。

10.2 缩叶长喙藓

Rhynchostegium contractum Cardot, Bulletin de la Société

Botanique de Genève 4: 381. 1912.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 NZ100506132, NZ100506135 (GACP)。乐业县: 唐启明 20180414–455, 20180414–456。天峨县: 赖明洲 KS89–10 (PE)。那坡县: 贾鹏等 NPPH100510195 (GACP)。武鸣县大明山国家自然保护区: 唐启明 20181105–116。龙胜县: 郭水良、于晶 110620148 (SHNU); 猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 686 as *R. fauriei* (HSNU); 何思、韦玉梅 48671。

分布: 中国广西百色市、河池市、南宁市、桂林市; 中国(陕西、河南、江苏、浙江、四川、贵州、湖南、安徽、云南、福建、广西、广东、台湾), 朝鲜, 韩国, 日本。

10.3 杜氏长喙藓

Rhynchostegium duthiei Müll. Hal. ex Dix., J. Bombay Nat. Hist. Sol. 39: 789. 1937.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 龙州大青山: 章博远等 2014565 (HSNU)。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远等 2014696 (HSNU)。宁明县: 章博远等 2014559 (HSNU)。

分布: 中国广西崇左市; 中国(四川、云南、广西、广东), 印度, 不丹。

10.4 斜枝长喙藓

Rhynchostegium inclinatum (Mitt.) A. Jaeger, Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1876–77: 366. 1878.

Hypnum inclinatum Mitt., Journal of the Proceedings of the Linnean Society 8: 152. 1864.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010; 胡人亮和王幼芳, 2005。

标本鉴定 龙州县: 章博远等 2014683 (HSNU)。

分布: 中国广西崇左市; 中国(新疆、西藏、陕西、山东、江苏、河南、四川、重庆、贵州、湖南、安徽、江苏、云南、广西、台湾), 日本。

10.5 卵叶长喙藓

Rhynchostegium ovalifolium S. Okamura, Journal of the College of Science, Imperial Univeristy of Tokyo 38 (4): 94. pl. 41. 1926.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 隆林县大哄豹自然保护区: 韦玉梅 8–175。西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 NZ100506124, NZ100506157, NZ100506159, NZ100506215, NZ100506230, NZ100506248, NZ100506250, NZ100506251, NZ100507098 (GACP)。西林县猫街自然保护区: 贾鹏等 XLMJ091020081, XLMJ091020083 (GACP)。西林县: 贾鹏等 XLMB091021009, XLMB091021079, XLMB091021091, XLMB091021099, XLMB091021236, XLMB091021107, XLMB091021210, XLMB091021214, XLMB091021228, XLMB091021230, XLMB091021252, XLMB091021254, XLMB091021255, XLMB091021256 (GACP)。乐业县: 唐启明 20171019–006, 20180417–836。天峨县: 龙光日、张灿明

等 160a (PE); 20180504-015; 20180504-019。那坡县: 谢强等 巴熊山 22; 韦玉梅等 20141204-50 (HSNU); 贾鹏等 NP091024092 (GACP)。那坡县老虎跳自然保护区: 韦玉梅 10-674。那坡县德孚自然保护区: 贾鹏等 NP091025007 (GACP)。靖西县邦亮自然保护区: 韦玉梅 8-599, 8-626A, 1952 (PE)。靖西县: 韦玉梅 20140914-18, 5-331, 8-634A, 8-757C, 8-759, 8-760, 8-762, 8-765B, 8-772, 8-774, 8-775。靖西县古文水源林保护区: 韦玉梅 8-700。大新县下雷水源林保护区: 韦玉梅 10-226。大新县恩城自然保护区: 唐启明 20180115-219。武鸣县三十六弄-陇均自然保护区: 韦玉梅 5-56。武鸣县大明山自然保护区: 唐启明 20181106-102。龙州县弄岗国家级自然保护区: 韦玉梅 5-597A。龙州县八更山: 章博远等 2014676, 2014679 (HSNU)。龙州县弄岗国家级自然保护区: 章博远等 2014699A, 2014743 (HSNU); 裴林英 176 (HSNU)。龙州县大青山: 章博远等 2014558, 2014567, 2014574B, 2014584 (HSNU)。宁明县十万大山国家级自然保护区: 章博远等 2014379A, 2014381B, 2014387 (HSNU)。上思县十万大山国家级自然保护区: 王幼芳等 2014184-a, 2014197, 2014207B。防城港市十万大山国家级自然保护区: 章博远等 2014426A, 2014429B。十万大山: 郭水良、于晶 a418 (SHNU)。融水县九万大山: 汪楣芝 45989 (PE)。龙胜县: 吴鹏程、林尤兴等 831 (PE); 韦玉梅 10-176; 郭水良、于晶 110619380 (SHNU)。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 606 (HSNU), 1957 (HSNU) as *R. pallenticaule*; 何思、韦玉梅 48680; 唐启明 20180907-36。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、河池市、南宁市、柳州市、桂林市; 中国(吉林、陕西、四川、贵州、重庆、湖南、云南、广西、福建、台湾), 日本。

10.6 淡枝长喙藓

Rhynchostegium pallenticaule Müll. Hal., Nuovo Giornale Botanico Italiano, new series 4: 271. 1897.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 隆林县: 韦玉梅 8-353, 8-356。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20180930-54, 20181008-610。那坡县: 谢强等 盆河 10; 韦玉梅 10-472。靖西县古文水源林保护区: 韦玉梅 8-668, 8-690A。靖西县邦亮自然保护区: 韦玉梅 8-632, 1978。靖西县湖涧: 胡舜士 54。武鸣县三十六弄-陇均自然保护区: 韦玉梅 5-60。武鸣县大明山自然保护区: 唐启明 20181107095。龙州县: 韦玉梅 5-474。上思县十万大山: 王健等 2014321; 章博远等 2014321。防城港市防城区十万大山国家级自然保护区: 章博远等 2014438C (HSNU)。龙胜县: 郭水良、于晶 110621181 (SHNU)。猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 677 (HSNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市、防城港市、南宁市、桂林市; 中国特有(黑龙江、吉林、陕西、浙江、云南、广西、广东、海南)。

10.7 淡叶长喙藓

Rhynchostegium pallidifolium (Mitt.) A. Jaeger, Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1876-77: 369.

Hypnum pallidifolium Mitt., Journal of the Proceedings of the Linnean Society 8: 153. 1864.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 刘倩, 2010。

标本鉴定 猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 539 as *R. subspeciosum* (HSNU)。

分布: 中国广西桂林市; 中国(新疆、西藏、内蒙古、吉林、辽宁、陕西、山西、山东、河南、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江、云南、广西、海南、香港、台湾), 韩国, 日本。

10.8 水生长喙藓

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, Bulletin de la Société Botanique de France 60: 231. 1913.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 乐业县: 唐启明、张仕艳 20181002-256。那坡县: 韦玉梅等 20141204-154 (HSNU)。靖西县: 韦玉梅 5-263, 5-266, 5-320。靖西县古文水源林保护区: 韦玉梅 8-680A。龙州炮台山: 韦玉梅 5-471A。融水县九万大山: 贾渝 00081 (PE); 汪楣芝 46104, 46123 (PE); 何小兰 H-00162 (PE)。龙胜县: 吴鹏程、林尤兴等 988 (PE); 金鑑明、胡舜士 949 (PE); 郭水良、于晶 110620023 (SHNU)。

分布: 中国广西百色市、崇左市、柳州市、桂林市; 中国(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、陕西、河北、山东、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、上海、江苏、浙江、安徽、云南、广西、广东), 印度、尼泊尔、不丹、巴基斯坦、坦桑尼亚、朝鲜、日本。

10.9 匍枝长喙藓

Rhynchostegium serpentinaule (Müll. Hal.) Broth., Nuovo Giornale Botanico Italiano, new series 13: 275. 1906.

Eurhynchium serpentinaule Müll. Hal., Nuovo Giornale Botanico Italiano, new series 4: 271. 1897.

种的特征描述: 参见刘倩, 2010。

标本鉴定 西林县那佐自然保护区: 贾鹏等 NZ100506099, NZ100506112, NZ100506221, NZ100506235, NZ100507015, NZ100507038, NZ100507082 (GACP)。西林县: 贾鹏等 XLMB091021218, XLMB091021222 (GACP)。西林县猫街自然保护区: 贾鹏等 XLMB091021139 (GACP)。乐业县雅长兰科植物国家级自然保护区: 唐启明、张仕艳 20180930-89, 20180930-95。那坡县: 韦玉梅 10-434; 贾鹏等 NP091024142 (GACP)。武鸣县大明山国家自然保护区: 唐启明 20181106-101。上思县十万大山: 郭水良、于晶 无采集号 s.n. (SHNU)。桂林市临桂区: 唐启明 20180910-272。金秀县大瑶山国家级自然保护区: 唐启明 20180515-625。

分布: 中国广西百色市、防城港市、南宁市、来宾市、桂林市; 中国特有(山西、陕西、四川、重庆、贵州、湖南、福建、江苏、浙江、云南、广西)。

11 拟青藓属

Sciuro-hypnum (Hampe) Hampe, Linnaea 38: 220. 1874.

Hypnum subg. *Sciuro-hypnum* Hampe, Flora 50: 76. 1867.

11.1 羽枝拟青藓

Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11: 270. 2002 [2003].

Hypnum plumosum Hedw. 258., Sp. Musc. Frond. 257-1801.

Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 8 (fasc. 52-54 Monogr. 4). 1853.

Brachythecium glauculum Müll.Hal., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s. 5: 199. 1898.

种的描述特征: 参见翟德逞, 2008。

标本鉴定 隆林县百色市大哄豹自然保护区: 韦玉梅 1512. 乐业县: 唐启明 20180409-51, 20180409-59, 20180413-423; 郭水良、于晶 110622012 (SHNU); 唐启明、张仕艳 20181002-276, 20181002-289. 靖西县邦亮国家自然保护区: 王健等 20130815-89 (HSNU). 环江县九万山: 汪楣芝 47057, 47123 (PE); 贾渝 00427a (PE). 罗城县九万山: 龙光日、张灿明 *L-89044* (PE). 九万大山: 龙光日、张灿明等 *GSY058-b* as *Brachythecium plumosum*, *H-046* (PE). 融水县九万大山: 贾渝 00039 (PE); 汪楣芝 46022 (PE); 何小兰 *H-00100-a* (PE). 融水县: 何小兰 *H00449* (PE). 龙胜县: 金鑑明、胡舜士 376-2, 376-3, 387, 394A-1, 394A-2, 416 (PE); 吴鹏程、林尤兴等 213, 213-2, 231, 1304-b, 1363, 1401 (PE); 郭水良、于晶 110619354, 110620194, 110620227 (SHNU). 龙胜县花坪: 郭水良、于晶 110619265, 110619317, 11062018, 110620131, 110620147, 110620156, 110620185, 110620307 (SHNU). 猫儿山国家自然保护区: 王幼芳、左勤 96, 143, 145, 147, 172, 176, 186, 188, 203, 254, 281, 323, 329, 333, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 349, 351, 354, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 386, 387, 465, 510, 514, 517, 521, 538, 546, 558, 559, 600, 603, 605, 607-1, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620as *B. glaciale*, 622, 673, 674, 675, 678, 683, 727, 734-1, 741-1, 742-1, 743-1, 744-1, 745-1, 746-1, 748-1, 749-1, 750-1, 751-1, 753-1, 754-1, 755-1, 756-1, 758-1, 759-2, 760-1, 761-1, 762-1, 763-1, 764-1, 765-1, 766-1, 768-1, 770-1, 772-1, 773-1, 774-1, 776-1, 777-1, 779, 780-1, 815, 837, 850, 871, 872, 887, 910, 921, 926, 933, 958, 960, 962, 963, 964, 967, 968, 969, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 990, 991, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1037, 1048, 1142, 1164b, 1187, 1249, 1259, 1316-1, 1319, 1329, 1357, 1362, 1364, 1366, 1372, 1373, 1376, 1378, 1381, 1382, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1392, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1403,

1405, 1407, 1410, 1412, 1413, 1414, 1419, 1421, 1425, 1427, 1428, 1430, 1431, 1432, 1435, 1439, 1560, 1561, 1562, 1563, 1566, 1567, 1570, 1571, 1572, 1573, 1575, 1670, 1682 (HSNU); 何思、韦玉梅 48603, 48706; 唐启明 20180907-16, 20180907-33; 赵芳芳 788, 801, 821, 846, 851, 898 (PE)。

分布: 中国广西百色市、河池市、柳州市、桂林市; 中国(新疆、西藏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、北京、山东、河南、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、上海、江西、福建、云南、广东、广西、香港、海南、台湾)以及北半球广泛分布。

11.2 长肋拟青藓

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11: 270. 2002 [2003].

Hypnum populeum Hedw., Sp. Musc. Frond. 270-271, pl. 70, f. 1-6. 1801.

Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 7. 535 (fasc. 52-56 Mon. 3. 1). 1853.

种的特征描述: 参见翟德逞, 2008。

标本鉴定 那坡县: 王健等 20130818-364 (HSNU); 贾鹏等 *NP091024144* (GACP). 天峨县: 赖明洲 *KS89-218* (PE)。

分布: 中国广西百色市、河池市; 中国(新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、陕西、河北、北京、山东、河南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江、云南、贵州、重庆、广西、台湾), 欧洲, 俄罗斯, 韩国, 日本, 不丹, 印度, 巴基斯坦, 尼泊尔, 印度尼西亚(爪哇), 北美。

11.3 弯叶拟青藓

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen, Arctoa 11: 270. 2002 [2003].

Hypnum reflexum Starke, Bot. Taschenbuch 306-307, 476. 1807.

Brachythecium reflexum (Starke) Schimp., Bryol. Eur. 6: 12 (fasc. 52-56. Monogr. 8). 1853.

种的特征描述: 参见胡人亮和王幼芳, 2005; 翟德逞, 2008。

标本鉴定 兴安县猫儿山国家自然保护区: 唐启明 20180907-20。

分布: 中国广西桂林市; 中国(新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、陕西、山西、河北、山东、河南、安徽、江苏、上海、浙江、四川、重庆、贵州、湖南、江西、福建、云南、广西、广东), 俄罗斯, 巴基斯坦, 塔吉克斯坦, 欧洲, 日本, 北美, 印度。

备注: 本文引证的标本绝大多数保存于广西植物研究所标本馆 (IBK), 河北师范大学植物标本馆 (HBNU) 存有上述副份标本, 其余引证标本现存放的标本馆均已标出。

(责任编辑 李莉)